Viburcol

Composition:

- **1 suppositoire contient:** atropa belladonna D4 1,1 mg, calcium carbonicum Hahnemanni D8 4,4 mg, chamomilla recutita D4 1,1 mg, plantago major D4 1,1 mg, pulsatilla pratensis D4 2,2 mg, solanum dulcamara D4 1,1 mg. Cette préparation contient en outre de la graisse solide comme excipient.
- 1 Récipient monodose de 1ml (=17 gouttes) contient: Atropa belladonna D6 11,0 mg Matricaria recutita D4 25,0 mg Plantago major D4 25,0 mg Pulsatilla pratensis D6 50,0 mg Solanum dulcamara D6 25,0 mg Calcium carbonicum Hahnemanni D8 75,0 mg La préparation contient d'autres excipients: chlorure de sodium, eau pour injections.

Domaine d'utilisation: selon la conception homéopathique, Viburcol® peut être utilisé en cas d'états d'agitation avec pleurs, d'insomnie, de douleurs dues à la pousse des dents ou de coliques.

Viburcol®, liquide à avaler, peut être utilisé pour un traitement symptomatique d'infections fréquentes.

Restrictions d'emploi: Jusqu'à aujourd'hui, aucune limitation d'emploi n'est connue.

Effets secondaires: aucun effet secondaire de Viburcol® n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. L'utilisation de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Viburcol® et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. En cas de vulnérabilité au refroidissement chez les enfants, il est recommandé de consulter un médecin. Si les états d'agitation persistent, il faut avoir recours à une aide médicale. En cas de fièvre élevée ou d'aggravation de l'état clinique, il est indiqué de consulter à temps le médecin, en particulier s'il s'agit d'un enfant. La survenue d'une forte fièvre chez les enfants de moins de 2 ans doit par principe être élucidée par un médecin.

Remarque: le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient. Garder les médicaments hors de portée des enfants. Conserver les suppositoires à température ambiante (15–25°C).



Viburgel® calme les gencives irritées et enflammées lors du processus naturel de poussées dentaires

Viburgel® contient des extraits de camomille, de sauge et de l'huile de clou de girofle qui ont un effet apaisant

Le Gel a un goût agréable et ne contient pas de sucre ajouté

Viburgel® est un produit cosmétique



Pour nourrissons et enfants lors:

- états d'agitation avec pleurs
- insomnie
- douleurs dues à la poussée des dents
- coliques















Pour nourrissons et enfants

Quels parents ne connaissent pas ces nuits sans sommeil, lorsque l'enfant souffre à nouveau de troubles liés à la poussée des dents?

Les symptômes d'accompagnement tels que plaintes et états d'agitation liés à des inflammations ou des spasmes des organes digestifs empêchent régulièrement les nourrissons et enfants de trouver leur sommeil réparateur. En moyenne, chaque enfant est soigné avec des médicaments au moins 2 fois par année pour combattre ces troubles.

Viburcol® est un suppositoire / liquide pour nourrissons et jeunes enfants. Il est constitué de 6 principes actifs homéopathiques différents qui régulent l'organisme avec douceur, sans masquer les signes cliniques. Ils agissent de façon douce et calmante.

Viburcol® peut être utilisé lors de traitements symptomatiques d'états d'agitation liés aux pleurs et au manque de sommeil, de même que lors de troubles de la poussée des dents ou de coliques.

Avantages

- peut être administré dès le premier mois de vie
- bien toléré
- pas d'effets secondaires connus à ce jour
- agit en douceur
- bien accepté par les parents
- s'applique aussi avec des préparations de la médecine empirique
- ils agissent de façon douce et calmante
- régulent l'organisme avec douceur, sans masquer les signes cliniques

Domaine d'utilisation

Domaine d'utilisation de Viburcol, à avaler selon la pharmacopée homéopathique	Composants
En cas d'états d'agitation	Camomille (Chamomilla)
avec ou sans fièvre, sur-	Belladone (Belladonna)
tout chez les nourrissons et les enfants:	Plantain (Plantago major)
- poussées dentaires	Anémone pulsatille (Pulsatilla)
 coliques intestinales 	Ecailles d'huîtres
légères	(Calcium carbonicum)
- insomnie	Morelle douce-amère
– Viburcol® liquide:	(Dulcamara)
pour le traitement	
symptomatique	
d'infections fréquentes	



Grandeur d'emballage:

15 récipient monodose à 1ml (Catégorie de remise D)

Grandeurs d'emballages:

12 et 60 suppositoires à 1,1 g (Catégorie de remise D)

Posologie

Conseils d'utilisation suppositoires

Groupe d'âges	Posologie si pas d'autres prescriptions
1 à 6 mois	1 suppositoire pas plus de 2 fois par jour
Dès 6 mois	Lors de troubles aigus, administrer plusieurs fois par jour 1 suppositoire. Dès amélioration, réduire à 2 à 3 suppositoires par jour.

Pour faciliter l'introduction du suppositoire chez l'enfant, veuillez l'induire d'un peu de pommade soignante (par exemple du vaseline). Pour le nourrisson (jusqu'à 23 mois), il est conseillé de couper le suppositoire dans le sens de la longueur.

Conseils d'utilisation liquide

Groupe d'âges	Posologie si pas d'autres prescriptions
Au-dessous de 2 ans	6 gouttes 3 x par jour Dosage en aigu: 6 gouttes toutes les ½–1 heure, jusqu'à 12 x jour
2–5 ans	9 gouttes 3 x par jour Dosage en aigu: 9 gouttes toutes les ½–1 heure, jusqu'à 12 x jour
6-11 ans	12 gouttes 3 x par jour Dosage en aigu: 12 gouttes toutes les ½-1 heure, jusqu'à 12 x jour
Adultes et adolescents dès 12 ans	1 monodose 3 x par jour Dosage en aigu: 1 monodose toutes les ½–1 heure, jusqu'à 12 x jour

www.viburcol.ch

