

Viburcol®

Pour nourrissons et enfants lors:

- états d'agitation avec pleurs et insomnie
- douleurs dues à la poussée des dents
- coliques



Titulaire de l'autorisation:
ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach

-Heel

D'états d'agitation

Dès l'apparition des premiers troubles physiques, les nourrissons deviennent une source d'inquiétude. Comme les petits ne peuvent pas communiquer ce qui les préoccupe, cela est parfois particulièrement difficile.

Les nourrissons et les enfants sont particulièrement touchés par problèmes digestifs avec des coliques de ballonnement ou des douleurs lors de la percée des dents. Ils sont souvent accompagnés d'états d'agitation et des pleurs.

Viburcol® suppositoire / liquide. Il est constitué de 6 principes actifs homéopathiques différents qui régulent l'organisme avec douceur.

Viburcol® peut être utilisé lors de traitements symptomatiques d'états d'agitation liés aux pleurs et au manque de sommeil, de même que lors de troubles de la poussée des dents ou de coliques.

Avantages

- peut être administré dès le premier mois de vie
- s'applique aussi avec des préparations de la médecine empirique
- propose différentes formes d'administration



Domaine d'utilisation

Domaine d'utilisation de Viburcol, à avaler selon la pharmacopée homéopathique	Composants
<p>En cas d'états d'agitation avec ou sans fièvre, surtout chez les nourrissons et les enfants:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poussées dentaires – coliques intestinales légères – insomnie – <i>Viburcol® liquide: pour le traitement symptomatique d'infections fréquentes, avec ou sans fièvre.</i> 	<p>Camomille (<i>Chamomilla</i>)</p> <p>Belladone (<i>Belladonna</i>)</p> <p>Plantain (<i>Plantago major</i>)</p> <p>Anémone pulsatille (<i>Pulsatilla</i>)</p> <p>Ecailles d'huîtres (<i>Calcium carbonicum</i>)</p> <p>Morelle douce-amère (<i>Dulcamara</i>)</p>



Grandeur d'emballage:
15 récipient monodose à 1ml
(Catégorie de remise D)

Grandeurs d'emballages:
12 et 60 suppositoires à 1,1 g
(Catégorie de remise D)

Posologie

Conseils d'utilisation suppositoires

Groupe d'âges	Posologie
1 à 6 mois	1 suppositoire pas plus de 2 fois par jour
Dès 6 mois	Lors de troubles aigus, administrer plusieurs fois par jour 1 suppositoire. Dès amélioration, réduire à 2 à 3 suppositoires par jour.

Pour faciliter l'introduction du suppositoire chez l'enfant, veuillez l'induire d'un peu de pommade soignante (par exemple du vaseline).

Conseils d'utilisation liquide

Groupe d'âges	Posologie
Au-dessous de 2 ans	6 gouttes 3 x par jour Dosage en aigu: 6 gouttes toutes les ½-1 heure, jusqu'à 12 x jour
2-5 ans	9 gouttes 3 x par jour Dosage en aigu: 9 gouttes toutes les ½-1 heure, jusqu'à 12 x jour
6-11 ans	12 gouttes 3 x par jour Dosage en aigu: 12 gouttes toutes les ½-1 heure, jusqu'à 12 x jour
Adultes et adolescents dès 12 ans	1 monodose 3 x par jour Dosage en aigu: 1 monodose toutes les ½-1 heure, jusqu'à 12 x jour

www.viburcol.ch

Composition:

1 suppositoire contient: atropa belladonna D4 1,1 mg, calcium carbonicum Hahnemanni D8 4,4 mg, chamomilla recutita D4 1,1 mg, plantago major D4 1,1 mg, pulsatilla pratensis D4 2,2 mg, solanum dulcamara D4 1,1 mg. Cette préparation contient en outre de la graisse solide comme excipient.

1 Récipient monodose de 1ml (=17 gouttes) contient: Atropa belladonna D6 11,0 mg Matricaria recutita D4 25,0 mg Plantago major D4 25,0 mg Pulsatilla pratensis D6 50,0 mg Solanum dulcamara D6 25,0 mg Calcium carbonicum Hahnemanni D8 75,0 mg La préparation contient d'autres excipients: chlorure de sodium, eau pour injections.

Domaine d'utilisation: selon la conception homéopathique, Viburcol® peut être utilisé en cas d'états d'agitation avec pleurs, d'insomnie, de douleurs dues à la poussée des dents ou de coliques.

Viburcol®, liquide à avaler, peut être utilisé pour un traitement symptomatique d'infections fréquentes.

Effets secondaires: aucun effet secondaire de Viburcol® n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre dragueur. L'utilisation de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Viburcol® et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre dragueur.

Précautions d'emploi: En cas de vulnérabilité au refroidissement chez les enfants, il est recommandé de consulter un médecin. Si les états d'agitation persistent, il faut avoir recours à une aide médicale. En cas de fièvre élevée ou d'aggravation de l'état clinique, il est indiqué de consulter à temps le médecin, en particulier s'il s'agit d'un enfant. La survenue d'une forte fièvre chez les enfants de moins de 2 ans doit par principe être élucidée par un médecin.

Remarque: le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient. Garder les médicaments hors de portée des enfants. **Conserver les suppositoires à température ambiante (15–25°C).**

www.viburcol.ch

Viburcol® – un doux soutien pour toute la famille



Bébé, petit enfant, élève, adulte – de nombreuses situations dans la vie quotidienne familiale fragilisent l'équilibre du corps et de l'âme: poussée dentaire, fièvre, agitation, douleurs légères, malaises et débuts d'infections. C'est justement dans ces moments-là qu'un doux soutien est précieux.

Des premiers mois de vie jusqu'au-delà de l'âge scolaire, et même chez les adultes: le liquide Viburcol® accompagne toute la famille.

Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez la notice d'emballage.

www.viburcol.ch